


# Συμπεριφορά & Συγκράτηση





“Fight or Flight” response  
Διέγερση συμπαθητικού συστήματος

# Συχνά ατυχήματα











# ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

- Ζώνη ασφαλείας = ζωτικός χώρος αλόγου
- Διάμετρος εξαρτάται από
  - α) χαρακτήρα
  - Ευάγωγα μικρή διάμετρος
  - Δύστροπα μεγάλη
  - β) ερέθισμα
  - γ) εμπειρία



# ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

- ◎ Σημείο ισορροπίας
- ◎ Ύψος ωμοπλάτης
- ◎ Στάση ανθρώπου πίσω από σημείο κίνηση αλόγου προς τα εμπρός
- ◎ Στάση ανθρώπου μπροστά από σημείο κίνηση αλόγου προς τα πίσω





# ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ


- ◎ **Αξιολόγηση στο ατομικό κελί**
- ◎ **Συχνή παρατήρηση 2 φορές την ημέρα από ιδιοκτήτη**
- ◎ **Στάση σώματος**
- ◎ **Έναρξη λήψη τροφής σε σχέση με παράθεση**
- ◎ **Συχνότητα και διάρκεια κατάκλισης**
- ◎ **Ανία, αεροφαγία, δαγκώματα πόρτας**

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

- ◎ Αξιολόγηση μετά την έξοδο από το ατομικό κελί
- ◎ Παρατήρηση από 3-4 μέτρα
- ◎ Βάδιση με ιδιοκτήτη για 30 μέτρα και επιστροφή
- ◎ Παρατήρηση σε στάση και βάδιση
- ◎ Ψηλάφηση δέρματος για υπερευαισθησία
- ◎ Εφίδρωση σε ανάπαυση


# Συγκράτηση ίππου

- Φυσικά μέσα




# Συγκράτηση ίππου

- Φυσικά μέσα – χειλοσφιγκτήρας




# Συγκράτηση ίππου

- Φυσικά μέσα – χειλοσφιγκτήρας



# Συγκράτηση ίππου

- Φυσικά μέσα – χειλοσφιγκτήρας




# Χειλοσφιγκτήρας

- Επώδυνο αρχικό ερέθισμα – έκλυση ενδορφινών
- Δεν λειτουργεί σε όλα τα άλογα (90%)
- Μετά από 30"-1' αν το άλογο δεν ακινητοποιηθεί -> ΑΦΑΙΡΕΣΗ

## Τοποθέτηση:

- στο άνω χείλος – στο κάτω χείλος – στη βάση του αυτιού
- κράτημα από το πλάι και όχι από μπροστά
- Παραμονή όχι > 90'
- όχι όταν ενδιαφέρει η εντόπιση πόνου



# Συγκράτηση ίππου

## ◉ Χημικά μέσα

Ρομιφιδίνη  
(40-120 $\mu$ g/kg IV)

Δετομιδίνη  
(0,01-0,08mg/kg IV)

Ξυλαζίνη  
(0,2-1,1mg/kg IV)


+/-

Βουτορφανόλη  
(0,03-0,08mg/kg IV)





# Ανύψωση και πρόσδεση πρόσθιου άκρου



## Ανύψωση πρόσθιου άκρου

- εξέταση πρόσθιου άκρου
- αδυναμία λακτίσματος με το σύστοιχο οπίσθιο άκρο

1) από εμπρός

2) από πίσω




# Μετακίνηση και ανύψωση οπίσθιου άκρου



# Κατάρριψη

- ⦿ επικίνδυνη, ιδίως για το ζώο
- ⦿ σε μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις
- ⦿ σε δύστροπα ζώα
- ⦿ προετοιμασία χώρου
  - ανοιχτός χώρος
  - έδαφος επίπεδο, μαλακό και στεγνό
  - τοποθέτηση παχιάς στρωμνής
  - ιδανικό το τροχήλατο χειρουργικό τραπέζι μεγάλων ζώων

- μετακίνηση άνω οπίσθιου άκρου στη σύστοιχη ωμοπλάτη
- για επεμβάσεις στα γεννητικά όργανα (ορχεκτομή) και στη βουβωνική χώρα





HORSE THERAPY